



# STANDARD REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSPLAN FÜR SCHWEINESTÄLLE



Buchenweg 6, CH-8636 Wald (Switzerland)

Ablauf	Zeitpunkt	Arbeiten	Produkte/Medium	Geräte
Vorarbeiten	Bei jedem Umtrieb	Bewegliche Einrichtungen aus dem Stall entfernen und extra behandeln. Darnach Stall ausmisten (besenrein). Herausnehmbare Spaltenböden hochkippen, Unterseite und Seitenflächen der Balken reinigen. Futterreste aus Silo, Behältern und Fütterungsanlagen entfernen. Vorräume und Lüftungsanlagen nicht vergessen.		Besen, Schaber usw.
Reinigung	Bei jedem Umtrieb	Stallflächen und Einrichtungen mit Niederdruck (10 bar) gut benetzen, zirka 3 Stunden einweichen lassen. Anschliessend, jedoch vor dem Eintrocknen, die Flächen mit Hochdruck (40-60 bar) reinigen. Nachher die Flächen mit EWABO Polyclean einsprühen. 1 Stunde einwirken lassen und gründlich nachspülen. Stall und Einrichtungen vor der Desinfektion schnell und gut abtrocknen lassen.	<b>EWABO POLYCLEAN</b> Dosierung 2% (2 l Konzentrat per 100 l Wasser). Einsatzmenge ca. 100 l Gebrauchslösung pro 100 m <sup>2</sup> Stallfläche.	Nieder-/Hochdruckreiniger Rückenspritze oder Sprühgerät
Desinfektion	Bei jedem Umtrieb	Alle Flächen und Einrichtungen sowie Vorräume min. 24 Stunden vor dem Einstellen der Tiere desinfizieren. Von vorne nach hinten arbeiten. Stall auf mindestens 20°C erwärmen.	<b>EWABO ALDEKOL DES 03</b> oder <b>EWABO ALDEKOL DES FF</b> Dosierung 1%. Unter 20°C Stalltemperatur Dosierung auf 2% erhöhen. Einsatzmenge 0,4 l Gebrauchslösung pro 1 m <sup>2</sup> Fläche. Einwirkzeit: 1 Stunde	Nieder-/Hochdruckreiniger Rückenspritze oder Sprühgerät  Bei Verwendung von EWABO Aldekol Des 03 Vollschutzmaske mit Filtertyp ABEK-P3 tragen. 
Reinigung und Desinfektion von Fütterungs- und Trinkwasseranlagen	Bei jedem Umtrieb	Vor Neubeschickung die Anlagen mit der Gebrauchslösung füllen. Einwirken lassen. Anschliessend gründlich ausspülen.	<b>EWABO SYSTEMCLEAN</b> Dosierung 2-3% (2-3 l Konzentrat auf 100 l Wasser). Einwirkzeit in Leitungen 24 Stunden.	
Desinfektion Futtersilos	Mindestens 24 Stunden vor Neubefüllung, vorausgesetzt die klimatischen Bedingungen erlauben eine Nassdesinfektion.	Silo einschliesslich Zusatzbehälter im Stall reinigen und anschliessend desinfizieren.	<b>EWABO ALDEKOL DES 03</b> oder <b>EWABO ALDEKOL DES FF</b> Dosierung 1%. Unter 20°C Stalltemperatur Dosierung auf 2% erhöhen. Einsatzmenge 0,4 l Gebrauchslösung pro 1 m <sup>2</sup> Fläche. Einwirkzeit: 1 Stunde	Nieder-/Hochdruckreiniger Rückenspritze oder Sprühgerät  Bei Verwendung von EWABO Aldekol Des 03 Vollschutzmaske mit Filtertyp ABEK-P3 tragen. 

# ZUSÄTZLICHE REINIGUNG UND DESINFEKTION VON SCHWEINESTÄLLE



Buchenweg 6, CH-8636 Wald (Switzerland)

Ablauf	Zeitpunkt	Arbeiten	Produkte/Medium	Geräte
Tiertransport-Fahrzeug	Nach jedem Transport	Stroh und Mist entfernen. Oberflächen mit EWABO Polyclean einsprühen und einwirken lassen. Danach Oberflächen desinfizieren.	<b>EWABO POLYCLEAN</b> , Dosierung 2% <b>EWABO ALDEKOL DES FF</b> , Dosierung 1%.	Nieder-/Hochdruckreiniger Rückenspritze oder Sprühgerät
Personalhygiene	Vor und nach jedem Betreten des Stalles	Desinfektionswanne mindestens 3-4mal pro Woche neu füllen. Eintrittsmatten sind stets nass zu halten. Kleider wechseln.	Für die Schuhdesinfektion <b>EWABO ALDEKOL DES FF</b> verwenden. Dosierung 2% (0,2 l Konzentrat auf 10 l Wasser).	Desinfektionswannen, Eintrittsmatten oder Sprühgerät
Bekämpfung von Endoparasiten	Bei Befall und nach der Reinigung und Desinfektion	Boden, Wände und Geräte bis 1,5 m Höhe besprühen.	<b>EWABO ALDECOC XD</b> Gegen Spulwurmeier: Dosierungen 2%, Einwirkzeit 1 Std. Gegen Kokzidien: Dosierung 4%, Einwirkzeit 2 Stunden.	Nieder-/Hochdruckreiniger Rückenspritze oder Sprühgerät
Schädlingsbekämpfung	Bei Befall	Insekten, Ratten und Mäuse können Krankheiten verbreiten und sind deshalb zu bekämpfen.	<b>FLY-END</b> oder andere geeignete Produkte verwenden.	

## DESINFEKTION IM BELEGTEN STALL

Vorbeugende Desinfektion	Wöchentlich oder je nach Infektionsdruck	Desinfektionsmittel möglichst fein versprühen.	<b>EWABO ALDEKOL DES FF</b> Dosierung 1% (1 l Konzentrat per 100 l Wasser). Einsatzmenge 0,4 l Gebrauchslösung pro 1 m <sup>2</sup> Fläche. Nicht direkt auf Tiere sprühen.	Feinsprühgerät, Rückenspritze oder Aerosolgenerator
Trinkwassersystem	Jeden Tag	Regelmässige Anwendung gewährleistet gesundes Trinkwasser und verhindert Ablagerungen.	<b>EWABO SYSTEMCLEAN</b> 4 ml Konzentrat pro 100 l Trinkwasser.	Dosierpumpe oder manuelle Dosierung

## DESINFEKTION BEI MELDEPFLICHTIGEN ERKRANKUNGEN

Desinfektion nach Tierseuchenverordnung	Bei Ausbruch von meldepflichtigen Tierseuchen	Reinigung und Desinfektion nach Anweisung des Kantonstierarztes vornehmen.	<b>EWABO ALDEKOL DES 03</b> Amtlich zugelassenes Desinfektionsmittel. Dosierung 1% (1 l Konzentrat per 100 l Wasser). Einsatzmenge 0,4 l Gebrauchslösung pro 1 m <sup>2</sup> Fläche. Einwirkzeit: 2 Stunden.	Nieder-/Hochdruckreiniger oder geeignete Bürsten  Bei Verwendung von EWABO Aldekol Des 03 Vollsichtmaske mit Filtertyp ABEK-P3 tragen.
---	---	--	--	--

